



Beter worden doe je thuis

Doelgroep

Jaarlijks worden er landelijk 50.000 mensen behandeld voor een psychiatrische crisis. 20% van deze doelgroep wordt opgenomen.

Landelijke zorgkosten

€ 515 miljoen voor alle D-, E-, F- en G-ligdagen in geïntegreerde GGZ instellingen.

Landelijke mogelijke besparing

€ 45 miljoen.

Betrokken zorgverleners

IHT team: Arts, psychiater, SPV, GZ-psycholoog, (senior)psychiatrisch verpleegkundige, ervaringsdeskundige en vaktherapeut.



Waarom?


- Cliënten met een psychiatrisch crisis worden tegenwoordig veelal thuis behandeld door het Intensive Home Treatment (IHT) team i.p.v. opgenomen in de kliniek.
- Thuisbehandeling is minder ontwrichtend doordat naasten nauw betrokken zijn en behandelaren bekend zijn.
- Er kunnen nog veel meer mensen thuis behandeld worden als het IHT-team de opnamebevoegdheid heeft over de kliniek.
- Bij Dimence heeft deze integrale keten van ambulante en klinische crisiszorg geleid tot 30% minder ligdagen.

Hoe?

Bij Stichting Dimence is er sprake van een integrale keten van ambulante en klinische zorg. Cliënten die in crisis raken, krijgen van het IHT-team intensieve crisiszorg in de thuissituatie. Het IHT-team van Dimence vervult een poortwachtersfunctie doordat zij bepalen wie er thuis en wie er in de kliniek behandeld wordt. Binnen de kliniek bepalen ze tevens wie ze weer thuis kunnen behandelen.



Reductie van 10% van de D-, E-, F- en G-ligdagen.



Besparing door GP



Na IHT-behandeling van 60,3% naar 26,3% (HONOS) m.n. op psychiatrische problematiek en algemeen functioneren.



Daling -34%



De CQ-index is gestegen met 23% tot een 7,8. Dit geeft aan dat patiënten meer tevreden zijn met de geleverde zorg.



Meer tevreden



Elnathan Prinsen | Psychiater
Dimence

“Zelfs in ernstige psychiatrische crisis kunnen mensen vaak beter thuis behandeld worden, zelf gedwongen opnames kunnen daar mee worden voorkomen.”

“Dit vraagt veranderingen in het denken en handelen van hulpverleners maar ook van patiënten en naastbetrokkenen. Het aantal en de duur van opnames wordt teruggedrongen en dat leidt juist tot kwalitatief betere zorg.”