

Poliklinische lasertonsillotomie

Doelgroep

In Nederland worden bij ongeveer 12.000 volwassenen per jaar de keelamandelen operatief verwijderd

Landelijke zorgkosten

De totale landelijke kosten voor het operatief verwijderen van keelamandelen bedragen jaarlijks circa €17,4 miljoen

Landelijke besparing

De werkwijze kan een landelijke besparing van circa €3,5 miljoen per jaar opleveren

Betrokken zorgverleners

KNO-arts, verpleegkundige



Waarom?

Jaarlijks vinden er ongeveer 12.000 keelamandeloperaties plaats bij volwassenen. Onder algehele narcose worden de keelamandelen volledig verwijderd. Deze ingreep is pijnlijk en kent een lange herstelduur met mogelijke complicaties zoals nabloedingen.

Wat en hoe?

Het HagaZiekenhuis behandelt patiënten met klachten aan de keelamandelen met een nieuwe innovatieve behandeling: lasertonsillotomie onder lokale anesthesie op de polikliniek. De keelamandelen worden bij deze behandeling gedeeltelijk verwijderd met een laser. Dit heeft als bijkomend voordeel dat de grote bloedvaten intact blijven. Hierdoor hebben patiënten minder last van postoperatieve bloedingen, herstellen ze sneller en is er minder pijnmedicatie na de operatie nodig. De totale ingreep duurt minder dan 1 uur waarna de patiënt direct naar huis kan. Doordat er geen narcose nodig is, wordt er tevens capaciteit op de OK bespaard.



Sneller naar huis



De lasertonsillotomie duurt ± 45 minuten waarna de patiënt direct naar huis kan. Bij de tonsillectomie moet de patiënt minimaal 6 uur tot 1 dag in het ziekenhuis blijven.



Sneller herstel



Na 2 weken is 77% van de patiënten volledig hersteld (in vergelijking met 57% bij tonsillectomie). Patiënten kunnen gemiddeld 8 dagen sneller weer starten met werken.



Lagere kosten



De poliklinische lasertonsillotomie bespaart gemiddeld €580 per patiënt.

Henk Blom | KNO-arts bij HagaZiekenhuis

"Fijn dat we deze techniek eindelijk kunnen aanbieden en hopelijk binnenkort ook buiten HagaZiekenhuis"

